

CALYPSO 48 SC

Control en Frutales

CALYPSO es un insecticida para el control de un amplio espectro de plagas y alta flexibilidad en la aplicación, ya que no afecta insectos polinizadores tales como abejas y abejorros, lo cual permite su aplicación, no sólo antes y después sino también durante la polinización.

Características

Ingrediente activo: Thiacloprid

Clase Química: Neonicotinoides

Formulación: Solución concentrada - 480 gr i.a. /L

Modo de Acción: Contacto e ingestión.

Modo de Acción

Como todos los neonicotinoides (cloronicotinilos), **CALYPSO** actúa a nivel de los receptores nicotínicos de la membrana de las células nerviosas, inhibiendo la acción de la acetil-colinesterasa con la consiguiente excitación de las células nerviosas y consecuente desorden del sistema nervioso, llevando a la muerte al insecto tratado.

Espectro de Acción



Pulgones - Grafolita - Carpocapsa - Chicharrita - Psílido

Calypso Presenta:

- Buenas propiedades sistémicas y de contacto con bajas dosis de aplicación.
- Excelente fitocompatibilidad y perfil eco-toxicológico.
- No presenta resistencia cruzada con otros insecticidas convencionales.

Recomendaciones de uso de Calypso 48 SC

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	PC	MOMENTO DE APLICACIÓN
Duraznero	Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (<i>Myzus persicae</i>)	25 cm ³ /hl + 0,2 % de coadyuvante	14 días	Iniciar los tratamientos al finalizar la caída de los pétalos y con la aparición de la plaga. Poder residual 21 a 28 días. En caso de reinfecciones, repetir el tratamiento.
Duraznero Nectarinos Ciruelo	Gusano del brote del duraznero (<i>Grafolita Molesta</i>)	25cm ³ /hl		El producto debe ser aplicado de acuerdo a los servicios de alarmas o bien de acuerdo a los planes de cura previamente establecidos. De no existir, al observar caídas en trampa o al ver brotes o fruta con daño. Repetir con un intervalo de 14-21 días logrando un mojado completo de las plantas. No aplicar menos de 400 cc/ha.
Manzana	Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) Chicharrita o Cotorrita (<i>Edwardsiana crataegi</i> (<i>douglas</i>) Gusano del Durazno (<i>Grafolita molesta</i>)	20cm ³ /hl	14 días	El producto debe ser aplicado de acuerdo a los servicios de alarma o bien de acuerdo a los planes de cura previamente establecidos.
Peral	Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) Psílido (<i>Cacopsylla pyricola</i>) Pulgón del algodónero (<i>Aphis gossypii</i>) Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (<i>Myzus persicae</i>)		7 días	
Nogal	Gusano de la Manzana y de la Pera (<i>Cydia pomonella</i>)		El producto debe ser aplicado de acuerdo a los servicios de alarmas o bien de acuerdo a los planes de cura previamente establecidos. De no existir, al observar caídas en trampa o al ver frutos con daño.	
	Pulgón del Nogal (<i>Cromoaphis jungligans</i>)	Aplicar al observar los primeros pulgones sobre las hojas. Poder residual 28 días. En caso de reinfecciones repetir el tratamiento. TC: 14 días.		