
PROYECTO DE ETIQUETA**CUERPO CENTRAL****FUNGICIDA - TERÁPICO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS**

Para uso exclusivo en plantas de tratamiento de semillas

Grupo	11
Grupo	4

CREATE PRO SEMILLERO

Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (SC-S)

Composición

trifloxystrobin: metilester del ácido metoxiimino-2-[1(3-(trifluorometil)-fenil)-etilidenamino oximetil]-fenil acético	7,69 g
metalaxyl: metilester de N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-DL-alanina ...	6,15 g
sovente y coadyuvantes c.s.p.	100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Inscripto ante el SENASA bajo el N° 36.436

Lote N°:

Vencimiento:

Industria Argentina

Contenido Neto:

No inflamable

BAYER S.A.

Ricardo Gutiérrez 3652 – (1605) Munro

Pcia. de Buenos Aires

República Argentina

www.bayercropscience.com. Tel. 011-4672-7000

CUERPO IZQUIERDO

PRECAUCIONES

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.

EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES

Seguir las precauciones habituales en el manejo de productos fitosanitarios. Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo de estos productos. Manipular con cuidado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

Equipo de protección personal a utilizar durante la manipulación: delantal, mascarilla, gafas de seguridad, guantes (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. Durante su aplicación utilizar: traje protector impermeable, mascarilla, gafas de seguridad, guantes (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. Procurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo. No comer, beber o fumar durante su manipulación y/o aplicación. No inhalar el producto y no exponerse a la neblina de la pulverización. No aplicar contra el viento. No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos. Después de realizada la aplicación del producto, lavar con agua los equipos utilizados. Después del trabajo, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la ropa de casa. Lavar la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

RIESGOS AMBIENTALES

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico. Toxicidad para peces: prácticamente no tóxico, no se espera exposición. Toxicidad para abejas: Prácticamente no tóxico, no se espera exposición.

TRATAMIENTO DE REMANENTES

Los remanentes de caldo de aplicación deben ser introducidos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en centros adaptados a los fines.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS

Los envases vacíos deben descontaminarse mediante triple enjuague. Para ello seguir los siguientes pasos: Llenar los envases con agua hasta 1/3 de su capacidad y cerrarlos firmemente con su tapa. Agitar enérgicamente los envases durante 30 segundos. Repetir dos veces los pasos 1 al 3. Inutilizar los envases realizando perforaciones en los mismos, evitando dañar la etiqueta en

esta operación. Los envases previamente inutilizados, deberán ser trasladados al centro de acopio AGROLIMPIO más cercano o a otros centros adaptados a los fines.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el envase original bien cerrado en lugar seco y fresco, lejos del fuego y fuentes de calor (Temperaturas inferiores a 25°C). Mantener apartado de semillas, fertilizantes y alimentos a efectos de prevenir la contaminación de éstos como también del agua de riego y de consumo.

DERRAMES

Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción por una empresa especializada y autorizada a tal fin.

PRIMEROS AUXILIOS

Retirar a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Quitar inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada.

En caso de salpicaduras en la piel: Sacar la ropa y los zapatos contaminados. Lavar con abundante agua y jabón. Si los síntomas continúan llamar al médico.

En caso de contacto con los ojos: Lavar cuidadosamente y a fondo con abundante agua tibia y seguir las indicaciones del médico.

En caso de inhalación: retirar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo.

En caso de ingestión NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Riesgo de que el producto ingrese en los pulmones si se produce el vómito después de la ingestión. Enjuagar la boca.

No administrar nada por boca a un paciente inconsciente.

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO

CLASE III – LIGERAMENTE PELIGROSO. CLASE INHALATORIA III (CIUDADO). IRRITACIÓN DERMAL: LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO)

CLASE IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. IRRITACIÓN OCULAR: LEVE IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CLASE IV: Causa irritación moderada a los ojos. NO SENSIBILIZANTE DERMAL.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA

No se conocen síntomas específicos.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: (011) 5950-8804/06. Hospital Italiano de Bs. As. Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”. Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”. Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital Escuela “José de San Martín”. (011) 4508-3931 / 5950-8000. **Buenos Aires:** Hospital Nac. “Prof. A. Posadas” (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 1102 / 0-800-333-0160. **La Plata:**

Hospital Interzonal de Agudos Esp. en Pediatría “Sor María Ludovica”. Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 (int. 1312) / 0800-222-9911. **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. **Rosario:** Hospital “J. M. Cullen”. Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. **Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Mendoza:** Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. **Chaco:** Hospital “J.C. Perrando”. Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. **Neuquén:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/44-90890.

Banda de categoría toxicológica color azul

CUIDADO

Pictogramas:



CUERPO DERECHO

RECOMENDACIONES DE USO:

GENERALIDADES:

CREATE PRO SEMILLERO está compuesto por los ingredientes activos trifloxystrobin y metalaxyl. Actúa en forma preventiva, curativa y erradicativa. Tiene acción sistémica y de contacto, controlando tanto las enfermedades que son diseminadas vía semilla, como aquellas presentes en el suelo. **CREATE PRO SEMILLERO** permite un buen establecimiento del cultivo y controla aquellas enfermedades que desde la semilla provocan una disminución en el stand de plantas. **CREATE PRO SEMILLERO** puede ser utilizado en forma preventiva y curativa.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN

La semilla a tratar, previamente debe ser ventilada, para eliminar todo resto de paja, polvo, etc. Debe tener buena energía germinativa y poder germinativo y se debe evitar la subdosificación. **CREATE PRO SEMILLERO** puede aplicarse diluido o sin diluir.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN

CREATE PRO SEMILLERO es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semilla. Es con ellos donde se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se posea este tipo de tecnología puede usarse tambor curasemillas u hormigonera, cuidando en estos casos de obtener una buena distribución del producto entre semillas y en la semilla. No es recomendado el mezclado en la sembradora o el paleo. Realizar el tratamiento al resguardo de los rayos solares. Es importante que la semilla se encuentre clasificada, totalmente libre de tierra, polvo e impurezas y la incidencia de las enfermedades de semilla que se desean controlar, en ningún caso supere el 40%. Verificar fecha de vencimiento. Almacenar en lugares frescos (Temperaturas inferiores a 25°C). No exponer las semillas tratadas al sol.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Dosis	Enfermedad	Momento de Aplicación
Canola	250 ml/ 100 kg de semilla	Fusarium (<i>Fusarium spp</i>), Alternaria (<i>Alternaria spp</i>), Pythium (<i>Pythium spp</i>), Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia spp</i>).	La aplicación debe ser realizada con antelación a la siembra.
Alfalfa, Trébol Rojo, Trébol Blanco, Lotus tenuis, Lotus corniculatus, Melilotus.	130 ml/ 100 kg de semilla.	Fusarium (<i>Fusarium spp</i>), Alternaria (<i>Alternaria spp</i>), Pythium (<i>Pythium spp</i>), Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia spp</i>).	
MAÍZ	33 a 66	<i>Fusarium (Fusarium spp)</i> , <i>Alternaria</i>	

	ml/100 Kg semilla	<i>(Alternaria spp), Pythium (Pythium spp), Rhizoctonia (Rhizoctonia spp), Cladosporium spp., Aspergillus spp.</i>	
SOJA	40 ml CREATE PRO SEMILLE RO (Trifloxystrobin 7,69 % + Metalaxyl 6,15 %) / 100 kg de semilla	<i>Mancha purpura (Cercospora kikuchii), Fusarium (Fusarium spp), Alternaria (Alternaria spp), Phomopsis (Phomopsis sojae), Antracnosis (Colletotrichum spp), Aspergillus (Aspergillus spp), Penicillium (Penicillium spp), Rhizopus (Rhizopus spp), Pythium (Pythium spp), Rizoctonia (Rhizoctonia spp),</i>	La aplicación debe ser realizada con antelación a la siembra. Para lograr un mayor stand de plantas agregar 20 ml de CREATE PRO MAX SEMILLERO (Prothioconazole 30%)/100 kg de semilla
MANI	40 ml CREATE PRO SEMILLE RO/100 kg de semilla + 20 ml de Create Pro Max Semillero/ 100 kg de semilla	<i>Fusarium (Fusarium spp), Aspergillus (Aspergillus spp), Penicillium (Penicillium spp), Rhizopus (Rhizopus spp), Pythium (Pythium spp), Rizoctonia (Rhizoctonia spp),</i>	La aplicación debe ser realizada con antelación a la siembra.

RESTRICCIONES DE USO

De uso posicionado

No aplicar **CREATE PRO SEMILLERO** cuando la semilla esté con daño mecánico.

“Aún encontrándose exentos de un establecimiento de tolerancias de manera local, es importante que en caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino”.

Importante: “La venta de semilla tratada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley. La Ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto con granos destinados al consumo, la Ley dictamina el decomiso y multas.”

“USO EXCLUSIVO PARA SEMILLEROS”

COMPATIBILIDAD

Se recomienda utilizar este producto en mezcla con CREATE PRO MAX SEMILLERO a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD

CREATE PRO SEMILLERO no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.